

新型コロナワクチンを接種した後について

～コミナティ®(ファイザー社)を接種した方へ～



ワクチンには、新型コロナウイルス感染症の発症や重症化を予防する効果が期待されていますが、副反応のリスクもあります。



接種後すぐに現れる可能性のある症状について

アナフィラキシー

- ・薬や食物が体に入ってから、短時間で起こることのあるアレルギー反応です。
- ・じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が急に起こります。血圧低下や意識レベルの低下(呼びかけに反応しない)を伴う場合をアナフィラキシーショックといいます。
- ・起こることは極まれで100万人に約5人ほどの確率とされています。
- ・接種後にもし、アナフィラキシーが起こっても、すぐに対応ができるよう、ワクチンの接種会場や医療機関では医薬品などの準備をしています。

撮取日
当
日

血管迷走神経反射

- ・ワクチン接種に対する緊張や、強い痛みをきっかけに、立ちくらみがしたり、血の気が引いて、時に気を失うことがあります。
- ・誰にでも起こる可能性がある体の反応で、通常、横になって体を休めれば自然に回復します。
- ・倒れてケガをしないように、背もたれのあるイスに座って様子をみてください。

○通常の生活は問題ありませんが、激しい運動や過度の飲酒は控えてください。

○接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は問題ありませんが、

接種部位は強くこすらないようにしましょう。



数
日

数日以内に現れる可能性のある症状について



発生割合	症状
50%以上	接種部位の痛み、疲労、頭痛
10~50%	筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ
1~10%	吐き気、嘔吐



○接種直後よりも翌日に痛みを感じている人が多いです。 コミナティ®添付文書より改編

○これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。

○疲労や関節痛、発熱など、1回目より2回目の方が頻度が高くなる症状もあります。

ワクチン接種後に体に異常がある時

○かかりつけ医

各医療機関の受診可能日をご確認ください

○山口県ワクチン接種専門相談センター

083-902-2277 24時間対応

ワクチン接種全般

○周南市ワクチン接種相談センター
(0834)22-8838 9時~17時

○周南市健康づくり推進課
(0834)22-8553 平日8時30分~17時15分